



服用硝化甘油片（NTG）注意事項



Nitroglycerin(0.6 毫克/錠)

★NTG 為一種冠狀血管擴張劑，在緊急時可緩解心臟缺氧，亦可作為臨床分辨冠狀動脈疾病之參考

★有心血管疾病病史者應隨時攜帶硝化甘油含片，以防緊急時使用。

服用方法：

1. 冠狀動脈疾病會引起胸悶、胸痛、胸部或咽喉部緊縮感等心臟缺氧狀況。
2. 疼痛 2~3 分鐘未緩解時，立即服用舌下含片一片，服用 5 分鐘後，若症狀持續或加劇，則立即 Call 119 就醫。等待就醫過程可再一次服用舌下含片。
3. 服藥時應採坐姿或臥姿，因有時會造成血管擴張及血壓下降，若頭暈的副作用過於明顯，應平躺或保持頭低腳高姿勢，等副作用消失後再起身，並儘速就醫。
4. 當有輕微辛辣感、頭脹、頭暈、頭痛是藥物正常反應，若完全無感覺，則藥物就可能失效。
5. 請以原有容器（棕色小瓶）保存藥品，並紀錄開瓶日期，於室溫 20-25°C 儲存，避免潮濕，並定期檢查藥片是否有變色或潮解現象。
6. 藥物的有效期為六個月，當藥效喪失或是含服時無辛辣感，表示已失效。
7. 長期服藥，藥效不會減退，也不會成癮，可以安心使用
8. 每月使用含片數量若有明顯增加應儘速就醫。

★避免與 Viagra(威而剛)、Cialis(犀利士)、Levitra(樂威壯)併用，以免產生嚴重低血壓。

參考資料：

2011 ACCF/AHA Focused Update Incorporated Into the ACC/AHA 2007 Guidelines for the Management of Patients With Unstable Angina/Non - ST-Elevation Myocardial Infarction Circulation May 10, 2011 vol. 123 no. 18 e426-e579

【本衛教單僅供衛教宣導用，圖文內容若有侵犯著作權，請惠予告知本院】