




氣喘急性發作的處置

★氣喘病惡化的先兆包括有：

- (1) 日常生活中提重物、夜間、運動後或爬樓梯後會有出現咳嗽、喘鳴、胸悶、呼吸急促或呼吸困難等症狀。
- (2) 短效支氣管擴張劑 (Berotec®/備勞喘) 的使用增加，效果較平日差，無法維持四個小時以上。



★氣喘發作處置流程 (用藥劑量請遵照醫師處方)：



★用藥後，症狀若未改善請盡速就醫。

【本衛教單僅供衛教宣導用，圖文內容若有侵犯著作權，請惠予告知本院】



衛教單張製作發行調查表

院內製作的中文衛教單張，將於本院使用，因此懇請您能於百忙之中，針對『印刷品質』、『文字大小』、『圖片或照片』、『美編排版』等部分，進行審閱與勾選，以作為送印前最後的確認，如有相關建議及需要改進的地方，懇請填入意見欄位內，俾利為修正之參考。感恩您的協助！

1. 此份衛教單的印刷品質顏色，您覺得：

滿意 普通 需改進：_____

2. 對此份衛教單的文字大小，您覺得：

滿意 普通 需改進：_____

3. 對此份衛教單的文字敘述，您覺得：

滿意 普通 需改進：_____

4. 對此份衛教單內文所附的圖片或照片，您覺得：

滿意 普通 需改進：_____

5. 此份衛教單的美編及排版，您覺得：

滿意 普通 需改進：_____

6. 整體而言此份衛教單張的發行使用，您是否：

同意 不同意 需改進：_____

衛教單張審核者簽名：_____

您的身分是：患者 家屬 社區民眾 院內員工

衛教單張名稱：氣喘急性發作的處置

備註：請您填完調查表後交給護理人員，再由護理人員將表單送至健教中心統一收齊繳

回企劃室審查，若有疑問請致電健教中心助理 4430 洽詢。