



居家靜脈營養使用注意事項

一、領取靜脈營養製劑時請於藥局清點數量是否正確及檢查外包裝是否有破損，如有損壞請立即更換。

二、本院居家使用之靜脈營養製劑有以下二種劑型：

斯莫克必恩周邊靜脈輸注液【Smofkabiven】 1448ml/1004卡 - 混合後呈白色液狀		必富力得注射液【BFLUID】 1000ml/420卡 - 混合後呈透明液狀	
			

三、使用靜脈營養製劑應注意事項：

- 1、注意外包裝上保存日期是否在使用期限內。
- 2、拆封前後應注意袋內是否有懸浮物或沉澱物等雜質，如有懸浮物、沉澱物或破損情形請勿使用並請與靜脈營養個管師聯繫。
- 3、全新未拆封之靜脈營養製劑應放置於室內陰涼處或冰箱冷藏保存。
- 4、自冰箱冷藏取出時，應先回溫至室溫(20-25°C)或體溫再使用。
- 5、一旦拆封混合後應立即使用，如未立即使用則須於冰箱冷藏(2-8°C)，保存期限最多6天。
- 6、使用前務必確認三袋(或二袋)液體已充份混合才可使用。

四、靜脈營養製劑滴注時間：12-24小時。

五、注射過程中如身體有出現以下不適情形，例如：

持續發燒、寒顫、噁心、心跳加快、盜汗、暈眩、胸悶、呼吸急促……等症狀，請暫停輸注，若症狀持續未改善，則請儘快至鄰近醫療院所或回本院求診。

六、聯絡方式：

電話：04-26581919 分機 58272 -靜脈營養個管師

本院急救專線：0800-557995

參考資料：台大醫院 營養醫療小組 (2006) · 臨床營養學_靜脈暨腸道營養 · 台北市：時新出版。

【本衛教單僅供衛教宣導用，圖文內容若有侵犯著作權，請惠予告知本院】