



鈉依賴型葡萄糖共同運輸蛋白-2 抑制劑使用說明

主成份(含量)	商品名	中文商品名	藥品外觀
Dapagliflozin 10mg	Forxiga	福適佳膜衣錠 10 毫克	
Empagliflozin 10mg Empagliflozin 25mg	Jardiance 25mg	恩排糖膜衣錠25毫克	
Canagliflozin 100mg	Canaglu	可拿糖膜衣錠100毫克	

藥物作用

1. 治療第二型(非胰島素依賴型)糖尿病
2. 抑制腎臟對葡萄糖的再吸收，增加尿糖排泄。

使用方法

1. 請遵照醫師指示的用法、用量使用，最好每天同一時間服用。
2. 可與食物併服或空腹時使用。

注意事項

1. 服藥前請先告知醫師是否有藥物過敏的病史。
2. 為使血糖得到良好控制，請遵照醫囑控制飲食及規律運動。
3. 目前沒有懷孕及哺乳婦女使用的相關研究。計畫懷孕者、孕婦或哺乳婦女應避免使用，就診時請先告知醫師。
4. 本類藥品會促進葡萄糖由尿液排泄，而**造成尿糖檢測結果呈陽性**。不建議服用 SGLT2 抑制劑的病患以尿糖檢測試驗做為監測血糖控制的方法。
5. 常見的不良反應是生殖器黴菌感染和尿路感染。平時應保持良好衛生習慣，如果出現感染症狀應就醫診治。
6. 合併使用胰島素，磺醯基尿素或含酒精飲食，可能產生低血糖。如果血糖低於 70mg/dl 或出現發抖、無力、心跳加速、疲倦、飢餓、頭暈、視力模糊、冒冷汗等症狀：意識清楚時應立即進食含 15 公克葡萄糖的食品，例如 3 包糖包等。15 分鐘

後再驗一次血糖，如果血糖仍然低於 70mg/dl，再補充一次含糖份食物，連續兩次補充食物仍未緩解低血糖症狀應立即送醫；在病人意識不清情況下，立即將頭部側放，用糖漿、蜂蜜、果糖塗於牙縫(舌下)，或依醫囑肌肉(皮下)注射升糖素後立即送醫。

7. 服用本類藥品應謹慎預防脫水導致的低血壓，嚴重時可能昏倒。建議應**攝取充足的水分**、每天測量並記錄血壓，如果發現血壓過低(低於 90/60 毫米汞柱)，應儘速就醫。
8. 如果出現酮酸中毒的症狀(例如：噁心、嘔吐、腹痛、疲累及呼吸困難)，即使血糖正常，應停用藥品並立即就醫。

忘記用藥怎麼辦

想起來時盡快補服，但若已經接近下一次服用時間，則照原來時間服用下次藥量，千萬不要一次服用兩次藥量。

資料來源：

1. 福適佳膜衣錠藥品仿單
2. 恩排糖膜衣錠藥品仿單
3. 可拿糖膜衣錠藥品仿單
4. Retrieved from MicromedexR 2.0, (electronic version). Truven Health Analytics, Greenwood Village, Colorado, USA. Available at: <http://www.micromedexsolutions.com/> (cited: 11/10/2016)

【本衛教單僅供衛教宣導用，圖文內容若有侵犯著作權，請惠予告知本院】